

【药理学】

下列关于抗结核药按作用机制不同分类的叙述错误的是

- A. 抑制 RNA 合成药, 如异烟肼
- B. 阻碍细菌细胞壁合成的药物, 如环丝氨酸
- C. 抑制结核杆菌蛋白合成药, 如链霉素
- D. 干扰结核杆菌代谢的药物, 如对氨基水杨酸钠
- E. 多种机制共存或机制未明的药物, 如乙胺丁醇

学员提问: 为什么选 A?

答案与解析: 本题答案为 A。

抗结核病药也可按作用机制的不同分为: ①阻碍细菌细胞壁合成的药物, 如环丝氨酸、乙硫异烟胺。②干扰结核杆菌代谢的药物, 如对氨基水杨酸钠。③抑制 RNA 合成药, 如利福平。④抑制结核杆菌蛋白合成药, 如链霉素和紫霉素等。【医学教育网原创】⑤多种机制共存或机制未明的药物, 如异烟肼、乙胺丁醇。

故本题答案选 A。

【中药学】

麻黄是治疗下列哪一种病证之要药

- A. 风热表证
- B. 风寒表证
- C. 风寒有汗表虚证
- D. 风寒无汗表实证
- E. 风寒挟湿表证

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

麻黄发汗力强, 为发汗解表之要药。多用于外感风【医学教育网原创】寒表实证, 恶寒无汗, 脉浮紧。

故本题答案选 D。

 【中医诊断学】
www.med66.com



颈侧颌下肿块, 累累如串珠者称为

A. 瘰疬



B. 瘰疬



C. 颈瘰



D. 项疔



E. 发颐

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。



瘰疬是指颈侧颌下有肿块如豆, 【医学教育网原创】累累如串珠者。多由肺肾阴虚, 虚火炼液为痰, 或外感风火时毒夹痰所致。瘰疬是指颈前结喉处有肿块, 或单侧或双侧, 可随吞咽上下移动者。多因肝郁气滞痰凝, 或与地方水土有关。



故本题答案选 B。



【中西医结合内科学】

符合“治痿独取阳明”原则的是

A. 补肝肾



B. 养肺阴



C. 滋肾阴

D. 去湿热



E. 化食滞



学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

“治痿者独取阳明”，是指补脾胃、【医学教育网原创】清胃火、去湿热。

故本题答案选 D。

【方剂学】

猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A. 白术、茯苓
- B. 泽泻、猪苓
- C. 滑石、甘草
- D. 茯苓、桂枝
- E. 滑石、阿胶

学员提问：为什么选 B？

猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。

方歌：猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添；【医学教育网原创】利水育阴兼泻热，潮秘心烦呕渴痊。

五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。

方歌：五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓；桂枝温通助气化，利便解表烦渴清。

故本题答案选 B。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019年第24期（word版下载）