

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 33 期

1. 【问题】目前诊断支气管扩张的主要方法是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 痰涂片或细菌培养
- C. 高分辨率 CT 检查
- D. 血气分析
- E. 血常规检查

【解答】选择 C。高分辨率 CT 检查可显示管壁增厚的柱状扩张或成串成簇的囊性改变，目前已是主要诊断方法。

2. 【问题】患者，男，34 岁。急性肺炎，在使用青霉素后发生过敏反应，出现面色苍白，出冷汗，发绀，血压下降等循环衰竭症状的原因是

- A. 胃肠道平滑肌痉挛
- B. 呼吸道分泌物增多
- C. 中枢系统缺氧
- D. 皮肤血管收缩
- E. 周围血管扩张

【解答】选择 E。青霉素过敏反应发生循环系统症状：表现为面色苍白、冷汗、发绀、脉细弱、血压下降等，由于周围血管扩张导致有效循环血量不足引起。此患者发生了青霉素过敏反应，主要是表现循环衰竭症状，说明发生休克反应，其原因是周围血管扩张而导致。而中枢系统即为神经系统的一部分，更多的表现为感觉、反射等症状，如中枢系统缺氧会导致头痛、恶心、呕吐等表现。

3. 【问题】体温为多少摄氏度才使用冰袋降温，多少度可以使用酒精擦浴？

【解答】体温超过 39.0℃，可用冰袋冷敷头部；体温超过 39.5℃时，可用乙醇拭浴、温水拭浴或做大动脉冷敷。行药物或物理降温半小时后，应测量体温，并做好记录及交班。

4. 【问题】房颤病人应观察哪些？

【解答】心房颤动的病情观察：密切观察脉搏、呼吸、血压、心率、心律，以及神志、面色等变化。严重心律失常病人应实行心电监护，注意有无引起猝死的危险征兆，如频发性、多源性、成联律、RonT 室性期前收缩，阵发性室上性心动过速，心房颤动，第二度 II 型房室传导阻滞等。随时有猝死危险的心律失常，如阵发性室性心动过速、心室颤动、第三度房室

传导阻滞等。如有发现，应立即抢救，报告医师进行处理。同时嘱病人卧床、吸氧、开放静脉通道、准备抗心律失常药物、除颤器、临时起搏器等。

5. 【问题】G2p1 表示什么意思？

【解答】G 表示怀孕 (gestation)；P 表示分娩、生产的意思 (parturition)。G2p1 表示孕 2 产 1 的意思。

