

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 50 期

【滋养细胞疾病】

关于侵蚀性葡萄胎错误的叙述是

- A. 具有恶性行为
- B. 恶性程度高
- C. 多数仅局部侵犯
- D. 预后好
- E. 早期表现为局部直接蔓延

【正确答案】B

【答案解析】侵蚀性葡萄胎为葡萄胎组织侵入子宫肌层引起组织破坏，或并发子宫外转移者。具有恶性行为，但恶性程度一般不高，多数仅局部侵犯，预后好。

【外阴色素减退疾病与外阴瘙痒】

外阴白色病变的诊断下列何项是错误

- A. 活检做病理诊断是最可靠的诊断依据
- B. 用碘涂抹病变区，皮肤出现不着色区，该处取材活检准确率高
- C. 活检应选择皮肤有溃疡、皲裂、隆起、硬结和粗糙等不同部位取材，方能做出病理分类
- D. 应在病变区做多点活检
- E. 由于病变不恒定，活检不仅要多点取材，还要定期随访，才能提高准确率

【正确答案】B

【答案解析】活检前先用 1% 甲苯胺蓝涂抹局部皮肤，干燥后用 1% 醋酸液擦洗脱色，在不脱色区活检。

【病理妊娠】

输卵管妊娠子宫变化不正确的叙述是

- A. 子宫增大
- B. 子宫内膜出现蜕膜反应
- C. 子宫变软
- D. 大于妊娠周数

E. 内膜反应的多样性

【正确答案】D

【答案解析】输卵管妊娠和正常妊娠一样，合体滋养细胞产生 hCG 维持黄体生长，使甾体激素分泌增加，致使月经停止来潮，子宫增大变软（但小于妊娠周数），子宫内膜出现蜕膜反应。

【女性生殖系统解剖】

分娩时行左侧会阴后一侧切开，不会被切断的肌肉为

A. 球海绵体肌

B. 坐骨海绵体肌

C. 会阴浅横肌

D. 会阴深横肌

E. 部分肛提肌

【正确答案】B

【答案解析】会阴侧切会损伤球海绵体肌，会阴浅、深横肌及部分肛提肌。但不会切断坐骨海绵体肌。