

1.男, 28 岁。反复上腹痛 2 年, 以夜间及空腹时为主, 加重并呕吐宿食 2 周, 伴口渴及少尿。该患者可能存在的电解质紊乱类型是

- A.低钙
- B.高钾高氯
- C.高钙
- D.高钠高氯
- E.低钾低氯

2.鉴别肝癌与肝血管瘤最佳的检查方法是

- A.腹部 MRI
- B.腹部多普勒超声
- C.放射性核素肝扫描
- D.腹部 CT 平扫
- E.内镜检查

3.肝硬化门静脉高压最严重的并发症是

- A.自发性细菌性腹膜炎
- B.原发性肝癌
- C.肝肾综合征
- D.上消化道出血
- E.肝性脑病

4.属于胃大部切除术后早期并发症的是

- A.术后胃瘫
- B.营养性并发症
- C.早期倾倒综合征
- D.残胃癌
- E.碱性反流性胃炎

5.肝硬化腹水形成的决定性原因是

- A.中心静脉压增高
- B.门静脉高压
- C.醛固酮分泌增高
- D.抗利尿激素增加
- E.肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅

6.男, 40 岁。乏力、反复牙龈出血及皮肤出血点 1 年。乙型肝炎病史 10 余年。查体: 左肋下可触及包块, 边界清, 质地韧, 有切迹, 随呼吸移动, 无压痛, 该包块可能是

- A.左肾
- B.胰腺癌
- C.脾脏
- D.胃癌
- E.肝脏左叶

幻灯片 11

7.男，22岁。大量饮酒后突发上腹部胀痛，伴恶心、呕吐2小时。查体：P 102次/分，BP 110/60mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。上腹部压痛明显，上腹痛（+），肠鸣音减弱。血、尿常规及尿淀粉酶检查、立位腹部X线平片均未见明显异常。最可能的诊断是

- A.急性肠梗阻
- B.胆囊结石
- C.急性胰腺炎
- D.急性胆囊炎
- E.上消化道穿孔

8.以下提示系统性红斑狼疮患者有神经精神狼疮可能，或其他重要内脏损害的自身免疫抗体是

- A.Sm
- B.RNP
- C.rRNP
- D.dsDNA
- E.ANA

9.以下关于腹股沟直疝的描述正确的是

- A.多数能进入阴囊
- B.多见于儿童和青壮年
- C.回纳后压住腹股沟内环，疝块不再突出
- D.极少发生嵌顿
- E.疝囊颈在腹壁下动脉外侧

10.升结肠癌的主要表现是

- A.便秘
- B.肠梗阻
- C.便血
- D.贫血
- E.腹泻

11.造成阑尾管腔阻塞从而诱发急性阑尾炎的最常见原因是

- A.阑尾肿瘤压迫
- B.食物残渣进入阑尾管腔
- C.阑尾壁淋巴滤泡增生
- D.蛔虫进入阑尾管腔
- E.粪石阻塞管腔

12.女，40岁。2天前体检超声提示胆囊内3cm强回声团，后伴声影，胆囊壁厚6mm。平素无不适。糖尿病病史5年，目前血糖控制良好。无腹部手术史。其他检查未见异常。最适合该患者的治疗方案是

- A.腹腔镜胆囊切除术
- B.保守治疗

- C. ERCP 取石
- D. 开腹胆囊切除术
- E. 胆囊造瘘术

13. 关于门静脉高压症的病因下列叙述有误的是

- A. 门静脉血流受阻是发病的重要因素
- B. 右心衰导致肝前型门静脉高压
- C. Budd-Chiari 综合征是肝后型常见病因
- D. 窦前型在我国多因血吸虫引起
- E. 肝窦型常见因素是肝炎后肝硬化

14. 最易演变成结肠癌的疾病是

- A. Peutz-Jeghers 综合征
- B. 克罗恩病
- C. 炎症性息肉
- D. 家族性肠息肉病
- E. 溃疡性结肠炎

15. 尿路感染的易感因素不包括

- A. 膀胱输尿管反流
- B. 留置导尿管
- C. 神经源性膀胱
- D. 糖尿病
- E. 青年男性

16. 女，40岁。双下肢水肿9天，尿量减少2天。查体：BP 150/100mmHg，双下肢重度水肿。尿蛋白（3+），血 Alb 17g/L，给予口服泼尼松，间断静脉滴注白蛋白及呋塞米。应用白蛋白的目的为

- A. 治疗原发病
- B. 缩短激素的疗程
- C. 提高血浆胶体渗透压
- D. 补充营养
- E. 控制血压

17. 要了解肾结核患者分肾功能、病变程度与范围。首选的检查方法是

- A. CT 平扫
- B. 静脉尿路造影
- C. MRI
- D. 逆行肾盂造影
- E. B 超

18. 男，35岁。B超发现右输尿管上段结石，大小1.2cm×0.8cm，合并轻度右肾积水。无发热，静脉尿路造影（IVU）显示右输尿管上段结石，右肾轻度积水，输尿管显影。首选的治疗方法

- A.体外冲击波碎石
- B.输尿管镜碎石取石
- C.经皮肾镜碎石取石
- D.开放输尿管切开放取石
- E.腹腔镜输尿管切开放取石

19.女，45岁。颈肩部伴左上肢放射痛1周。查体：Eaton 试验（+）。颈部MRI显示C5~6，C6~7椎间盘向左后突出8mm，关节突增生。颈椎斜位X线检查显示C5~6椎间孔稍变窄。首选的治疗措施是

- A.颈横肌锻炼
- B.椎板切除减压术
- C.前路椎间盘切除
- D.后路椎间盘切除
- E.颌枕吊带牵引

20.男孩，14岁。左膝关节上方肿痛3个月，夜间加重。查体：左膝关节上方肿胀、压痛（+）、皮温高；静脉怒张，触及一肿物，硬而固定。X线检查示干骺端有溶骨破坏及日光放射状骨膜反应。最可能的诊断是

- A.骨结核
- B.骨囊肿
- C.骨巨细胞瘤
- D.骨肉瘤
- E.转移性骨肿瘤

21.慢性肾小球肾炎患者，尿蛋白760mg/d，血压160/90mmHg，该患者通常的血压控制目标是

- A.120/80mmHg 以下
- B.125/75mmHg 以下
- C.130/80mmHg 以下
- D.140/90mmHg 以下
- E.135/85mmHg 以下

（22~23题共用题干）

男，28岁。6小时前从4米高处坠落，不能站立行走。查体：左小腿明显肿胀，中段畸形，足背动脉搏动减弱，皮肤温度较对侧降低，被动屈伸足趾时疼痛加重。

22.下列治疗方法首选的是

- A.镇痛剂，激素治疗
- B.小腿石膏托固定
- C.筋膜室切口减压
- D.小夹板固定
- E.跟骨结节骨牵引

23.此类临床发现的最主要原因是

- A.胫腓骨骨折不稳定

- B.骨折压迫动脉影响血供
- C.骨折压迫静脉影响血流
- D.骨筋膜室内压力增高
- E.小腿部广泛组织挫伤

(24~25 题共用备选答案)

- A.枪刺样畸形
- B.爪形手畸形
- C.垂腕畸形
- D.银叉样畸形
- E.天鹅颈样畸形

24.桡骨远端骨折时侧面观察的畸形表现是

25.尺神经损伤最容易出现的畸形是

参考答案:

2022 开年第一课,

当前水平测试, 我拿下了 \_\_\_\_分 / 25!

01 ~ 05	EAEAB
06 ~ 10	CCCDD
11 ~ 15	CABDE
16 ~ 20	CBAED
21 ~ 25	CCDDB

正保医学教育网  
www.med66.com