

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 16 期

1. 【问题】儿童死亡率最高发生在哪一时期

A. 幼儿期

B. 学龄期

C. 胎儿期

D. 新生儿期

E. 婴儿期

【解答】选择 D。新生儿期：自胎儿娩出脐带结扎至生后 28d 止（在婴儿期内）。出生后不满 7 天者称新生儿早期，此期发病率高，死亡率高。

2. 【问题】急性心衰治疗原则口诀巧记。

【解答】端坐位；

腿下垂；

强心利尿打吗啡；

血管扩张氨茶碱；

激素结扎来放血激素，镇静，吸氧。

3. 【问题】血压分类和标准。

【解答】

分类	收缩压	和	舒张压
正常血压	<120	和	<80
正常血压高值	120~139	和（或）	80~89
高血压	≥140	和（或）	≥90
1 级高血压	140~159	和（或）	90~99
2 级高血压	160~179	和（或）	100~109
3 级高血压	≥180	和（或）	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和	<90

注：当收缩压和舒张压分属于不同分级时，以较高的级别为标准。以上标准适用于任何年龄的成年男性和女性。

4. 【问题】小儿添加辅食顺序。

【解答】

月龄	食物形状	引入的食物	餐数		
			主餐	辅餐	进食技能
4~6 个月	泥状食物	含铁配方米粉、配方奶、蛋黄、菜泥、水果泥	6 次奶 (断夜间奶)	逐渐加至 1 次	用勺喂
7~9 个月	末状食物	粥、烂面、烤馒头片、饼干、鱼、全蛋、肝泥、肉末	4 次奶	1 餐饭 1 次水果	学用杯
10~12 个月	碎食物	厚粥、软饭、面条、馒头、碎肉、碎菜、豆制品、带馅食品等	3 餐饭	2~3 次奶 1 次水果	抓食 断奶瓶 自用勺

5. 【问题】鹅口疮的临床表现

- A. 口腔黏膜上有白色乳凝块样物
- B. 凝块易拭去而遗留溢血创面
- C. 凝块不易拭去，重拭无溢血

D. 局部疼痛，拒食、流涎

E. 以上都不是

【解答】选 A。鹅口疮是白色念珠菌感染，多见于新生儿、营养不良、腹泻、长期使用抗生素或激素的患儿。临床特征是在口腔黏膜上出现白色乳凝块样物，初起时为点状或小片状，渐融合成片，不易拭去，重拭可有溢血。D 选项是疱疹性口炎的表现。

